


Satyr černohlavý – tragopan melanocephalus CITES I

Tento satyr patří do seznamu zvířat bezprostředně ohrožených vyhynutím.
Rozšíření je v malých ostrůvcích v severozápadní Himálaji, severním Pákistán a severozápadní Indii

Kohout: délka 70 - 75cm
váha 1800-2000g
Slípka: délka 55-60cm
váha 1200-1400g



Kohout má hlavu černou lysé tváře jsou červenooranžové barvy, krk je červený, zbytek těla černohnědý s bílými skvrnami na každém peru.

Slípka je hnědočerné s podélnými žlutohnědými proužky každém peru, břicho má šedohnědé s bílými skvrnami.



O biologii tohoto satyra je známo velmi málo informací. Snáší 2-6 vajec které snáší do opuštěných hnízd jiných druhů ptáků. Po inkubaci trvající 28-30dnů vychovává mladé kteří s rodiči zůstávají přes celou zimu až do jara kdy se v době toku (březem- duben) osamostatňují.



Tento nejvzácnější druh satyra obývá lesy s podrostem rododendronů a bambusů ve výškách 2500-4000m.n.m. v zimním období pak schází na hranici 2000m.n.m.. V přírodě přežívá v současné době populace v počtu 2000- 5000 kusů a stále se snižuje.



V zajetí se chová pouze v záchranném centru Srahan Himachal Pradesh v Indii. Kde se ve spolupráci s WPA probíhá výstavba chovatelského zařízení včetně lůhni a ostatního zázemí. Dále pak WPA provedlo proškolení místních ošetřovatelů v Anglii. Toto opatření mají vést k pokusu o umělý odchov tohoto satyra a následně o reintrodukci do původních lokalit jeho výskytu.

V roce 1860 se do ZOO Londýn dovezlo na 50 kusů tohoto satyra bohužel do roku 1930 postupně v zajetí vymizel a v současné době se mimo výše zmíněné centrum Sarahan jinde na světě pravděpodobně nechová.



M.Stehlík tel: +420723442917

e-majl: adsl_227052@nexta.cz

web <http://www.tragopan.wz.cz/>

autor fotografií Francy Hermans