

Srovnání satyrů

Bažantům satyrům se bohužel, stejně jako jiným druhům ptáků, nevyhnulo mezidruhové křížení, což má za následek degradaci populace a ohrožení původní genetické výbavy druhu. Tento poslední díl série pojednání o bažantech satyrech, by mohl posloužit jako vodítko pro posouzení a porovnání populace satyrů v našich chovech. Je to porovnání tří druhů satyrů, kteří jsou chováni v naší republice. Jedná se o tyto druhy: satyr cabotův - tragopan caboti, satyr obecný - tragopan satyra a satyr temminckův - tragopan temminckii. Jsou zde porovnávány čistokrevní jedinci těchto druhů ve srovnatelných pozicích. Všem chovatelům přeji v chovu mnoho zdaru.

SLEPICE SATYRŮ	blythi	caboti	melanocephalus	satyra	temminckii
VÁHA	1000-1500	900	1250-1400	1000-1300	970-1100
DÉLKA OCASU	170-175	151-171	190-200	195	158-178
DÉLKA KŘÍDLA	232-260	210-215	255-290	215-235	202-218
VEJCE VÁHA	62	53,9	61,3	63,3	47,7
VEJCE VELIKOST	58x44	55x41	63x42	65x42	54x40
BARVA OKOLO OKA	žlutá	oranžová	červená	hnědá	modrá

DELACOUR 1977

text a foto: Miloslav Stehlík, adsl_227052@nexta.cz, tel.: +420723442917



Kohout obecný.



Kohout cabot.



Kohout temminck.






Kříženec obecný×temminck.



Kříženec cbot×temminck.



Vejce satýrů.

Slípka obecný.



Slípka cabot.



Slípka temminck.

