

Bažant obecný (*Phasianus colchicus*)

– neobyčejný bažant

Bažant obecný (*Phasianus colchicus*) je snad nejznámější bažant celého světa. Jeho jméno je odvozeno od řeky Phasis (dnešní Rioni) protékající tehdejší Kolchidou (historická oblast dnešní Gruzie). Právě z Kolchidy měl Jason se svými Argonauty do Řecka tyto bažanty přivést. Dnes už víme, že to jsou jen báje.

Bažant obecný je nejoblíbenější lovný pták a není tak divu, že jej lovci rozšířili do nejrůznějších koutů světa. U těchto uměle introdukovaných bažantů se ve většině případů jedná o míšence několika poddruhů, kteří se kloní, někdy více či méně, k určitému poddruhu.

Podobu bažanta obecného si vybaví snad každý. Pestré zbarvení, dlouhý ocas a v době toku výrazně červená pouška tak typická pro kohouta, naproti tomu zemitě zbarvená, nenápadná slepička. Jeho zvonivé tleskání křídel a varovné volání bylo běžnou součástí každého výletu do přírody. Bohužel i tento polní pták doplatil na hospodaření v přírodě, a proto se s ním na většině míst potkáme jen díky umělým odchovům.



Phasianus colchicus strauchii

Výskyt

Areál výskytu čistokrevných poddruhů bažanta obecného je rozsáhlý. Sahá od Tajwanu, Japonských ostrovů a Číny, přes Mongolsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Afgánistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Írán, Ázerbajdžán, Arménii až po Rusko a Řecko.

Jeho životním prostorem jsou nejčastěji křovinatá území a rákosové porosty kolem vodních toků.

Podruhy bažanta obecného patří mezi velmi ohrožené. Tito neobyčejní opeřenci čelí neuváženému ničení jejich přirozeného biotopu, nadměrnému lovu, pytláctví, vysoké predaci a hybridizaci.

Podruhy

Bažant obecný tvoří 33 poddruhů, které se liší svým zbarvením a velikostí. Nejmarkantnější rozdíly nalezneme u kohoutů, naopak slepičky jsou si svým vzhledem velmi podobné. Tyto podruhy můžeme rozdělit do 6 skupin:

1. skupina - Bažanti černokrcí

Hlavním znakem této skupiny je černý krk bez jakéhokoliv náznaku obojku. Do skupiny bažantů černokrkých patří: *Phasianus c. colchicus*, *Phasianus c. talischensis*, *Phasianus c. septentrionalis*, *Phasianus c. persicus*



Phasianus colchicus colchicus



Phasianus colchicus colchicus

2. skupina – Bažanti kirgizští

Charakteristickým znakem bažantů kirgizských je výrazný bílý obojek a bronzové zbarvení. Patří sem *Phasianus c. mongolicus* a *Phasianus c. turcestanicus*

3. skupina – Bažanti bělokřídlí

Pro bažanty bělokřídlé jsou charakteristické bílé krovky křídel. Řadíme sem: *Phasianus c. schawi*, *Phasianus c. principalis*, *Phasianus c. zerafschanicus*, *Phasianus c. zarudnyi*, *Phasianus c. bianchii* a *Phasianus c. chrysomelas*

4. skupina – Bažanti s olivově zbarveným kostřecem

Phasianus c. tarimensis



Phasianus colchicus bianchi

5. skupina – Bažanti s šedě zbarveným kostřecem

Phasianus c. vlangalii, Phasianus c. alaschanicus, Phasianus c. sohokotensis, Phasianus c. endzinensis, Phasianus c. hagenbecki, Phasianus c. satscheuensis, Phasianus c. pallasi, Phasianus c. takasukasae, Phasianus c. formosanus, Phasianus c. karpowi, Phasianus c. torquatus, Phasianus c. strauchi, Phasianus c. suehschanensis, Phasianus c. elegans, Phasianus c. decollatus, Phasianus c. rothschildi, Phasianus c. kiangsuensis

6. skupina – Bažanti zelení

Phasianus versicolor robustipes, Phasianus versicolor versicolor, Phasianus versicolor tanensis



Phasianus colchicus bianchi

Chov

V chovech jsou čistokrevné poddruhy zastoupeny vzácně, asi jen 14 poddruhy. Chovatelé se potýkají s úzkou genetickou základnou, která má v některých případech za následek špatnou líhnivost a posléze horší životaschopnost kuřat. Chov v Evropě pochází pouze z několika ptáků od každého poddruhu dovezených z Ruska. Později se podařilo genetickou základnu rozšířit u několika poddruhů ptáky původem z Ameriky.

Jejich vlastní chov není nijak náročný. Chovatel si musí zvyknout, že se jedná o poměrně těkavé ptáky. Voliéry jsou vhodné prostorné, kryté nejlépe sítí, která zamezí případnému zranění bažanta při prudkém vzletnutí.

Tok začíná začátkem března, kdy se kohouti začnou ozývat svým typickým voláním. Zajímavé je i dvoření kohouta, který roztahuje svých 18 ocasních per směrem ke slepičce, uklání se a snaží se ukázat co nejvíce své barevné peří.



Phasianus colchicus mongolicus

Snáška začíná začátkem dubna. Slepíčka snáší kolem 14 vajec, při odebírání mnohem více. Vejce inkubujeme v líhni nebo lépe pod kvočnou klidného plemene slepic. Bažantí slepice může zasednout na vejce ve vhodné voliére i sama, ale pro jejich neklidnou povahu bývá s takovým odchovem často problém. Kuřata se líhnou za 24 dní. Krmíme je krmnou směsí pro bažantí kuřata. Dospělým bažantům předkládáme směs různých zrnin, sezónní ovoce, zeleninu a kompletní krmnou směs pro dospělé ptáky. Před obdobím snášky přecházíme na směs pro bažantí nosnice a klíčené obilniny.

Bažant obecný není obyčejným bažantem. Pro svou krásu a jedinečnost je pro chovatele často srdeční záležitostí a životním koníčkem.

Text a foto: Ondřej Širůček